

## Territorio provinciale di PARMA

# Bollettino di Difesa Fitosanitaria

### n. 20 del 09 giugno 2017

#### TEMPO STABILE E CALDO

**SABATO 10:** cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio nubi ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in lieve aumento con minime comprese tra 16 e 21°C, massime comprese tra 27 e 34°C.

**DOMENICA 11:** cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature pressoché stazionarie.

**TENDENZA DEL TEMPO DA LUNEDÌ 12 A GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2017:** prevalenti condizioni di cielo sereno, salvo temporanei annuvolamenti di scarsa consistenza. Temperature in lieve aumento ad inizio periodo, stazionarie successivamente.

#### Andamento meteorologico dal 31 maggio al 06 giugno 2017

Stazione meteorologica	Altitudine m slm	Temp max	Temp min	Temp media	Temp max assoluta	Temp min assoluta	Escursione termica	Umidità relativa media (%)	Pioggia (mm)
NEVIANO ARDUINI	514	27,4	17,5	22,1	29,7	16,6	9,9	47,4	0,0
VARANO MARCHESI	440	28,4	17,3	22,4	30,7	16,0	11,1	48,7	0,0
MAIATICO*	317	29,0	17,7	23,4	30,6	16,5	11,3	46,6	0,2
PIEVE CUSIGNANO	270	29,9	18,3	23,3	32,1	16,5	11,7	45,0	1,0
SALSOMAGGIORE	170	30,8	16,8	23,8	32,4	15,8	13,9	50,9	0,2
PANOCCHIA	170	30,2	15,3	23,1	32,2	14,0	15,0	44,4	22,4
SIVIZZANO Traversetolo*	136	29,0	18,4	23,7	30,6	17,2	10,7	47,3	0,0
PARMA URBANA	60	31,2	16,2	24,8	32,9	16,2	15,0	42,7	0,6
S. PANCRAZIO	59	30,7	17,2	24,0	32,3	15,0	13,4	41,6	0,0
FIDENZA*	59	30,4	17,8	24,0	32,1	16,7	12,6	50,7	0,0
SISSA*	32	29,8	16,7	23,3	31,6	15,6	13,1	54,6	0,0
ZIBELLO	31	31,0	14,2	22,4	32,8	13,0	16,8	60,1	0,0
GAINAGO – Torrile	28	30,5	16,3	23,3	32,6	15,1	14,3	55,1	0,4

\*= dato ottenuto per interpolazione.

Aggiornamenti previsioni del tempo sul sito di ARPA Emilia-Romagna Servizio IdroMeteoClima:

<http://www.arpa.smr.it/sim/>



## BOLLETTINO DI PRODUZIONE INTEGRATA

### DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA (D.P.I.) DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNATA 2016 - 2017.

**DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA:** LE INDICAZIONI RIPORTATE NEI DISCIPLINARI SONO VINCOLANTI PER LE AZIENDE INSERITE NEI PROGRAMMI RELATIVI AL REG. CE 1698/2005- MISURA 214, REG. CE N° 1580/2007 E 1234/2007 - LLRR 28/99.

**DIFESA INTEGRATA OBBLIGATORIA:** LE INDICAZIONI SOTTO RIPORTATE, NON SONO VINCOLANTI E SONO DA CONSIDERARSI DEI CONSIGLI (DECRETO N°150/2012).7

I D.P.I. sono lo strumento tecnico a disposizione dei produttori agricoli per razionalizzare le tecniche agronomiche e di difesa fitosanitaria. I D.P.I. consentono di aderire alle Azioni 1 produzione integrata, misura 214 Asse 2 del PSR 2007-2013, all'Az. 3 Arboricoltura da legno a ciclo breve, misura 221 PSR 2007-2013, al Marchio Collettivo QC L.R. 29/99 e al OCM ortofrutta Reg. UE 1308/2013.

**Con Determinazione del Responsabile Servizio Agricoltura Sostenibile n. 2685 del 24/02/2017 è stato approvato l'aggiornamento della fase di coltivazione dei DPI 2017. L'atto citato contiene le modifiche apportate alla edizione 2016. L'aggiornamento ha ricevuto il parere di conformità alle Linee guida nazionali di produzione integrata.**

**Tutti i testi integrali 2017 delle singole colture e l'atto di approvazione sono scaricabili dal sito E-R Agricoltura e pesca all'indirizzo:**

**<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi/disciplinari-2017>**

#### **Consigli nella scelta delle formulazioni.**

È consigliabile nella scelta dei prodotti fitosanitari dare preferenza a quelli che vengono commercializzati in formulazioni meno pericolose per l'operatore agricolo e per l'ambiente. In particolare sono da preferire le formulazioni costituite da emulsioni in acqua

---

(contrassegnati dalle lettere EW), granuli disperdibili (WG, WDG o DF), granuli solubili (SG) e sospensioni di microcapsule (CS) rispetto a quelle costituite da polveri bagnabili (PB, WP), polveri solubili (PS, WS) e concentrati emulsionabili (EC) che presentano maggiori rischi per l'operatore nella fase di preparazione della miscela e rendono più difficoltose le operazioni di lavaggio e di bonifica dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari. Le sospensioni concentrate (SC) ed i prodotti costituiti da pasta fluida, flowable (FL, FLOW) riducono il rischio tossicologico per l'operatore ma per bonificare i contenitori occorre realizzare un accurato lavaggio. L'impiego di sacchetti idrosolubili risulta essere la soluzione ideale per la tutela dell'operatore e dell'ambiente.

**Principi attivi previsti dal Reg. CEE n. 834/07 (produzione biologica) regolarmente registrati in Italia.**

Possono essere utilizzati tutti i formulati commerciali classificati come "Xi", "Nc" e Xn. Solo se specificatamente indicati nelle norme tecniche possono essere utilizzati anche formulati commerciali classificati come "T" e "T+".

**DEROGHE 2017**

Le deroghe concesse ai disciplinari di difesa integrata volontaria sono consultabili al seguente link: <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/deroghe/deroghe-territoriali-2017>

**Le richieste devono essere formulate per iscritto (lettera o e-mail) dalle aziende o da loro delegati ai seguenti indirizzi:**

- Regione Emilia-Romagna - Servizio Fitosanitario Regionale - Via Saliceto, n. 81 - 40129 Bologna
- E-mail certificata all'indirizzo: [omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it)
- E-mail non certificata all'indirizzo: [deroghefito@regione.emilia-romagna.it](mailto:deroghefito@regione.emilia-romagna.it)

- 13 APRILE 2017 protocollo n° PG/2017/0287576: è stata emessa una deroga ai disciplinari di produzione integrata (Reg. UE n. 1698/05; 1305/13; n. 1308/13; n. 1234/07, LLRR n. 28/98 e 28/99) valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo del formulato "**Merlin FLEXX**" a base di **isoxaflutole** per il diserbo del mais dolce; impiego consentito nel periodo 10 aprile - 7 agosto 2017.

- 20 APRILE 2017 protocollo n° PG/2017/0299060: è stata emessa una deroga ai disciplinari di produzione integrata (Reg. UE n. 1698/05; 1305/13; n. 1308/13; n. 1234/07, LLRR n. 28/98 e 28/99) valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna per l'impiego del formulato **AF-X1 2017**, contenente la sostanza attiva microrganismo

---

*Aspergillus flavus* ceppo MUCL54911; impiego consentito per 120 giorni dal 29 marzo al 26 luglio.

- 21 APRILE 2017 protocollo n° PG/2017/0306111: è stata emessa una deroga ai disciplinari di produzione integrata (Reg. UE n. 1698/05; 1305/13; n. 1308/13; n. 1234/07, LLRR n. 28/98 e 28/99) valida per il territorio delle province di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia e Modena per la ripetizione della pulizia del letto di semina con **glifosate** alle dosi previste dal DPI in caso di risemina delle colture dovuta ai consistenti abbassamenti termici delle mattinate dei giorni 19, 20 e 21 aprile.

- 26 MAGGIO 2017 protocollo n° PG/2017/0394296: è stata emessa una deroga ai disciplinari di produzione integrata (Reg. UE n. 1698/05; 1305/13; n. 1308/13; n. 1234/07, LLRR n. 28/98 e 28/99) valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna per l'esecuzione di un intervento con la s.a. **Dimetoato** per la difesa della bietola dall'afide nero (*Aphis fabae*).

- 31 MAGGIO 2017 protocollo n° PG/2017/0404838: è stata emessa una deroga ai disciplinari di produzione integrata (Reg. UE n. 1698/05; 1305/13; n. 1308/13; n. 1234/07, LLRR n. 28/98 e 28/99) valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per l'esecuzione di un ulteriore trattamento con insetticidi neonicotinoidi (uno in alternativa fra **Thiametoxam, Imidacloprid e Clothianidin**) per il controllo di reinfestazioni di afidi e per contenere la contemporanea presenza di popolazioni di cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) su pero.

- 08 GIUGNO 2017 protocollo n° PG/2017/0424650: è stata emessa una deroga ai disciplinari di produzione integrata (Reg. UE n. 1698/05; 1305/13; n. 1308/13; n. 1234/07, LLRR n. 28/98 e 28/99) valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per la realizzazione di un intervento con il formulato "**EXIREL 2017**" a base di **Cyantraniliprole** per la difesa del ciliegio dal moscerino dei piccoli frutti (*Drosophila suzukii*); impiego consentito nel periodo 06 giugno - 03 ottobre 2017.

- 08 GIUGNO 2017 protocollo n° PG/2017/0424671: è stata emessa una deroga ai disciplinari di produzione integrata (Reg. UE n. 1698/05; 1305/13; n. 1308/13; n. 1234/07, LLRR n. 28/98 e 28/99) valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per l'esecuzione di un trattamento con la s.a. **Pirimicarb** per la difesa del sorgo dagli afidi.

### FERTILIZZAZIONE

**Si evidenzia che nel capitolo 10 delle Norme Generali, a pagina 10, è stato introdotto un vincolo specifico per l'impiego del rame: "Se si utilizzano dei prodotti fertilizzanti fogliari contenenti rame metallico (Cu) la sua quantità distribuita deve essere registrata perché concorre al raggiungimento del limite previsto dalle norme fitosanitarie (tali**

quantitativi devono essere indicati nelle schede di registrazione della difesa). Si ricorda che su tutte le colture la quantità massima di rame impiegabile in un anno è di 6 kg/ha di sostanza attiva.

I quantitativi di macroelementi da apportare devono essere calcolati adottando il metodo del **Bilancio previsionale** oppure avvalendosi del software specifico scaricabile dal seguente link: "[Foglio di calcolo per formulazione piano di fertilizzazione](#)".

In alternativa alla redazione di un piano di fertilizzazione analitico è possibile adottare il modello semplificato secondo le **Schede a dose standard** presenti nelle norme tecniche di coltura dei Disciplinari scaricabili qui: [http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi/dpi\\_2017/norme-coltura-2017](http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi/dpi_2017/norme-coltura-2017).

Le caratteristiche chimico-fisiche del terreno si possono desumere attraverso l'analisi del terreno oppure utilizzando i dati forniti dal Catalogo dei suoli ([www.suolo.it](http://www.suolo.it)). Per alcune colture da seme è consentito solo l'utilizzo del metodo dose standard come indicato nelle norme di coltura.

I piani di fertilizzazione devono essere redatti in ciascuna annualità:

- entro il 28 febbraio per le colture erbacee e foraggere
- entro il 15 aprile per le colture orticole, arboree e sementiere.

## **COLTURE ERBACEE**

**POMODORO** fase fenologica: **ALLEGAGIONE 2° PALCO NEI PRIMI TRAPIANTI - FIORITURA 1° PALCO NEI MEDI**

Sono in corso i trapianti più tardivi, con una superficie trapiantata stimata al 95% di quella programmata. Proseguire la concimazione post-trapianto rispettando sempre le unità da piano di concimazione.

### **DIFESA**

**PERONOSPORA:** il rischio Peronospora è molto basso, modello epidemiologico IPI sotto soglia di attenzione, tuttavia i temporali previsti ad inizio settimana, con lieve riduzione delle temperature, consigliano un trattamento cautelativo con rame in miscela con endoterapico nei primi trapianti e solo rame negli appezzamenti meno sviluppati.

**BATTERIOSI:** le escursioni termiche, il forte vento e le piogge di maggio hanno determinato la comparsa delle primissime infezioni di *Pseudomonas siringae* pv. *tomato* sulle varietà meno tolleranti, ma l'attuale andamento meteorologico ne limita la progressione.

---

**AFIDI:** sono comparse le prime colonie. Monitorare gli appezzamenti. Se superata la soglia (10% di piante con colonie in accrescimento presenti in 4 o 5 metri lineari lungo la diagonale del campo) concordare con il tecnico della propria O.P. se intervenire, preferibilmente sui bordi dell'appezzamento, con formulati a base di Imidacloprid, Thiamethoxam (Actara), Acetamiprid (Epik SL), Fluvalinate, Azadiractina, Flonicamid (Teppeki), Spyrotetramat (Movento), Sali potassici di acidi grassi (Flipper), Piretrine pure.

#### **DISERBO**

In campi infestati da *Solanum nigrum* intervenire, con l'infestante allo stadio di cotiledoni, con Metribuzin in miscela con Rimsulfuron (Executive). In presenza di graminacee (giavone e sorghetta) impiegare Ciclossidim, Cletodim, Quinalofop-etile isomero d, Quinalofop-p-etile, Propaquizafop.

Nei campi infestati da Orobanche (*Phelipanche ramosa*) è possibile intervenire in manichetta dopo 20-30 giorni dal trapianto. Rimsulfuron può essere distribuito 2-3 volte al dosaggio massimo di 110 g/ha, in alternativa al trattamento fogliare. Nelle coltivazioni biologiche si può impiegare un formulato a base di estratti d'aglio.

**CIPOLLA: PRIMAVERILE** fase fenologica: **INGROSSAMENTO BULBO** - **AUTUNNALE** fase fenologica: **RACCOLTA**

---

#### **DIFESA - FARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA**

**BOTRITE:** modesta presenza di sintomi su foglia, monitorare i propri appezzamenti. In previsione di piogge intervenire con antibotritici quali: Fludioxinil + Cyprodinil (Switch), Pyraclostrobin + Boscalid (Signum), Pyrimetanil (Scala), Fenexamid (Teldor Plus), facendo attenzione ai tempi di carenza.

**PERONOSPORA:** non si segnalano infezioni.

**TRIPIDI:** si segnala la presenza di infestazioni: E' possibile intervenire con Spinosad, Deltametrina, Betacyflutrin.

**MOSCA:** non si segnalano infestazioni, ridotta presenza nelle trappole. Si consiglia di installare trappole cromotropiche innescate con attrattivo ammoniacale e di monitorare il campo per individuare mosche o larve nei bulbi. In presenza di mosca è possibile intervenire con formulati a base di Deltametrina o Etofenprox (Trebon Up).

**FRUMENTO TENERO e DURO e ORZO** fase fenologica: **MATURAZIONE CEROSA**

---

La difesa può considerarsi conclusa

---

## ERBA MEDICA fase fenologica: SFALCIO - SVILUPPO VEGETATIVO

---

### DIFESA

**APION:** sui ricacci successivi al primo sfalcio si osservano infestazioni, verificare la situazione. In caso di elevata infestazione è possibile intervenire con Lambdacialotrina, Betaciflutrin, Tauflualinate, Acetamiprid, Deltametrina.

## BARBABIETOLA DA ZUCCHERO fase fenologica: CHIUSURA INTERFILA

---

### DIFESA

**CERCOSPORA:** non si segnalano sintomi. Il modello previsionale della Cercospora si sta avvicinando alla soglia di comparsa delle prime macchie. Si consiglia quindi di monitorare gli appezzamenti.

**AFIDE NERO:** presenza di infestazioni localizzate, verificare la presenza in campo. In caso di superamento soglia (30% delle piante con colonie e mancanza di ausiliari) è possibile intervenire con Esfenvalerate (Metis Echo, Sumialfa Echo) o Dimetoato (autorizzato in deroga).

## MAIS fase fenologica: 4/12 FOGLIE VERE - LEVATA

---

### DIFESA

La Regione Emilia-Romagna ha concesso una deroga territoriale per l'utilizzo del prodotto AF-X1, a base di *Aspergillus flavus*, ceppo atossigeno MUCL 54911, per la prevenzione delle AFLATOSSINE. Il prodotto va distribuito a pieno campo, con spandiconcime centrifugo o pneumatico opportunamente tarato, nella fase compresa tra inizio allungamento dello stelo e 9 o più nodi visibili.

**DIABROTICA:** provvedere all'installazione delle trappole.

## SORGO fase fenologica: 3 - 6 FOGLIE VERE

---

**DISERBO:** in post-emergenza precoce, a partire dalla terza foglia, è possibile intervenire con S-metolaclo + Terbutilazina. In presenza di sole dicotiledoni utilizzare, entro le 4-6 foglie, 2,4D + MCPA o Dicamba + Prosulfuron (Casper) o Bentazone (Blast SG).

## COLZA fase fenologica: MATURAZIONE SEMI - PRE-RACCOLTA

---

La difesa può considerarsi conclusa.

## PISELLO PROTEICO fase fenologica: MATURAZIONE SEMI - RACCOLTA

---

La difesa può considerarsi conclusa.

---

## SOIA fase fenologica: PRIME FOGLIE - 5<sup>a</sup> FOGLIA TRIFOGLIATA

---

**DISERBO:** in post-emergenza intervenire a partire dalla fase di prima foglia trifogliata. In presenza di infestanti dicotiledoni utilizzare Clomazone, Tifensulfuron, Bentazone con dominanza di Amaranto e Solanum o Imazamox con dominanza di Amaranto, Solanum e Abutilon. Per il contenimento delle infestanti graminacee intervenire con Ciclossidim, Fluazifop-p-butile, Fenoxaprop-p etile, Quizalafop-p etile, Quizalafop-etile isomero D, Propaquizafop, Cletodim.

---

## GIRASOLE fase fenologica: LEVATA - SVILUPPO CALATIDE

---

**DISERBO:** in presenza di graminacee è possibile impiegare Ciclossidim, Propaquizafop, Quilazafop-p-etile, Quizalafop-etile isomero D, Fenoxaprop-p-etile. Per il controllo di dicotiledoni è possibile utilizzare Aclonifen e Tribenuron. Imazamox è impiegabile solo su varietà resistenti agli erbicidi della classe degli imidazolinoni.

<b>COLTURE ARBOREE</b>
------------------------

---

## VITE fase fenologica: ALLEGAGIONE - INGROSSAMENTO ACINI

---

### ASPETTI AGRONOMICI

**GESTIONE DELLA CHIOMA:** in considerazione dello sviluppo vegetativo iniziare le operazioni di leggera cimatura.

### DIFESA

**PERONOSPORA:** nei due campi spia (porzione di vigneto non trattato), che vengono monitorati costantemente, non sono comparse macchie d'olio per cui le piogge di maggio non sono risultate infettanti, come previsto dal modello IPI.

**OIDIO:** nei due campi spia (porzione di vigneto non trattato) si osservano sintomi di Oidio su foglie e, anche su grappolo, mentre non sono evase infezioni di Peronospora. Considerato il tempo stabile, con temperature in aumento, previsto nel prossimo periodo potrebbe iniziare la fase epidemica delle infezioni secondarie dell'Oidio. Si consiglia pertanto di mantenere protetta la coltura con Zolfo in polvere o antioidici ad elevata attività sul grappolo quale Quinoxifen (Arius), Metrafenone (Vivando), Cyflufenamid (Rebel Top, Cidely), Trifloxystrobin (Flint) in miscela con antiperonosporico.

**FLAVESCENZA DORATA:** anche quest'anno è obbligatoria la lotta alla Flavescenza dorata. Sulla base del monitoraggio del vettore *Scaphoideus titanus*, eseguito dai tecnici del Consorzio Fitosanitario, il trattamento nella provincia di Parma è consigliato nel periodo compreso tra il 20 ed il 30 giugno. Gli insetticidi ammessi in produzione integrata sono Buprofezin (Applaud Plus), Chlorpirifos-metile, Chlorpirifos-etile, Thiamethoxam (Actara



---

25 WG) o Acetamiprid (Epik SL). In caso di utilizzo di Buprofezin, regolatore di crescita efficace sulle forme giovanili, anticipare l'intervento di 7-10 giorni, seguito da un secondo intervento abbattente. In vigneti con forte presenza di Scafoideo si consiglia l'esecuzione di un secondo intervento dopo circa 30 giorni. Le aziende agricole ubicate nelle aree nelle quali è previsto un trattamento obbligatorio che adottano strategie di difesa di tipo convenzionale od integrato e che intendono utilizzare, per la lotta allo Scafoideo, i prodotti ammessi in agricoltura biologica debbono eseguire almeno i due interventi previsti per i vigneti a conduzione biologica.

**RAGNETTO GIALLO:** non si riscontrano infestazioni in campo, a superamento soglia (60-70% di foglie con forme mobili) intervenire con: Clofentezine, Exitiazox, Tebufenpirad, Pyridaben, Etoxazolo, Abamectina.

---

### **ALBICOCCO fase fenologica: MATURAZIONE FRUTTI - RACCOLTA VARIETA' PRECOCI**

---

#### **DIFESA**

**OIDIO:** intervenire negli impianti solitamente colpiti con Zolfo, Ciproconazolo, Fenbuconazolo, Miclobutanil, Tebuconazolo, Bupirimate, Fluopiram, Quinoxifen, Trifloxistrobin + Tebuconazolo.

**BATTERIOSI:** su impianti e varietà solitamente colpite intervenire in caso di prolungate bagnature con Sali di rame (Selecta Disperss).

**AFIDI:** al superamento della soglia (5% di getti infestati) intervenire con Imidacloprid o Acetamiprid (Epik).

**FORFICULA (*Forficula auricularia*):** in caso di danni riscontrati nell'anno precedente si consiglia di applicare un anello di colla sul tronco delle piante in modo da formare una barriera ed impedire alle forficule di salire sulle piante e danneggiare la produzione.

---

### **PESCO fase fenologica: INGROSSAMENTO FRUTTI - MATURAZIONE**

---

#### **DIFESA**

**OIDIO:** sulle varietà sensibili, in presenza dei sintomi intervenire con Zolfo, IBE (Ciproconazolo, Fenbuconazolo, Miclobutanil, Penconazolo, Propiconazolo, Tebuconazolo, Tetraconazolo), Trifloxistrobin + Tebuconazolo, Quinoxifen (Arius), Fluopyram, Bupirimate (Nimrod).

**BATTERIOSI:** su impianti e varietà solitamente colpite intervenire, in previsione di piogge che determinano bagnature superiori alle 48 ore e con temperature medie comprese tra i 14°C ed i 19°C, con Sali di rame (Selecta Disperss).

---

**CIDIA MOLESTA:** da modello prosegue l'ovodeposizione ed è cominciata la nascita larvale. Indicazioni su eventuali interventi saranno forniti nei prossimi bollettini. Provvedere alla sostituzione del fondo coloso e del feromone delle trappole.

**AFIDE VERDE:** presenza di infestazioni. Nel caso di superamento soglia (3% di getti infestati su nettarine, 10% su pesche e percoche), intervenire con: Acetamiprid, Imidacloprid, Thiametoxam, Clothianidin, Flonicamid, Pirimicarb, Spirotetramat (Movento), attivo anche contro Cocciniglie.

#### **CILIEGIO fase fenologica: MATURAZIONE - RACCOLTA**

---

##### **DIFESA**

**AFIDI:** al 3% di organi infestati intervenire da caduta petali con Imidacloprid, Acetamiprid (Epik), Thiametoxam (Actara), Piretrine pure.

**MOSCIERINO DEI PICCOLI FRUTTI (*Drosophila suzukii*):** rilevate ovodeposizioni in campo. Si ricorda che gli interventi effettuati da invaiatura con Spinosad per altre avversità hanno effetti anche contro questo parassita. In pre-raccolta è possibile intervenire con Deltametrina facendo attenzione ai tempi di carenza.

**MOSCA:** intervenire nella fase di invaiatura in presenza degli adulti nelle trappole cromotropiche gialle.

#### **MELO fase fenologica: INGROSSAMENTO FRUTTO**

---

##### **DIFESA**

**TICCHIOLATURA:** negli impianti senza sintomi sospendere gli interventi, mentre in quelli con presenza di malattia mantenere protetta la vegetazione dalle infezioni secondarie con Dithianon (Delan) o Ditiocarbammati (Propineb, Metiram).

**OIDIO:** presenza di infezioni. Intervenire alla comparsa dei primi sintomi con Zolfo, Ciflufenamide, Bupirimate (Nimrod), Quinoxifen (Arius), IBE (Ciproconazolo, Difenconazolo, Fenbuconazolo, Miclobutanil, Penconazolo, Tebuconazolo, Tetraconazolo), Tryfloxistrobin + Tebuconazolo, Fluopyram.

**CARPOCAPSA:** da modello completata la nascita larvale. A breve è previsto l'inizio generalizzato del volo di seconda generazione. Provvedere alla sostituzione di trappole e feromoni.

**AFIDE GRIGIO:** rilevate reinfestazioni. Intervenire a superamento soglia (5% di piante colpite) con Azadiractina, Flonicamid, Imidacloprid, Thiametoxam, Acetamiprid, Clothianidin, Pirimicarb, Spirotetramid, Sali di potassio di acidi grassi (Flipper).

**AFIDE LANIGERO:** intervenire al superamento della soglia (10 colonie su 100 organi) con Spirotetramat (Movento)

---

**BUTTERATURA AMARA:** nelle aziende e sulle varietà normalmente interessate da questa fisiopatia si consiglia di intervenire con concimi fogliari contenenti Calcio.

**PERO fase fenologica: INGROSSAMENTO FRUTTI**

---

#### **DIFESA**

**TICCHIOLATURA:** in generale gli attacchi sono molto lievi. Terminato il volo ascosporico. Negli impianti senza sintomi sospendere gli interventi, mentre in quelli con presenza di malattia mantenere protetta la vegetazione dalle infezioni secondarie con Dithianon (Delan) o Ditiocarbammati (Propineb, Metiram).

**MACULATURA BRUNA:** il modello previsionale indica un rischio infettivo in diminuzione. In previsione di periodi piovosi e umidi (le condizioni ottimali per la sporulazione sono comprese tra 18°C e 22°C) o di prolungate bagnature intervenire con Boscalid, Fluopiram, Penthiopirad, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Ciprodinil + Fludioxonil, Fludioxonil, Tebuconazolo, Fluazinam, Thiram, Captano, Ziram.

**CARPOCAPSA:** da modello completata la nascita larvale. A breve è previsto l'inizio generalizzato del volo di seconda generazione. Provvedere alla sostituzione di trappole e feromoni.

**AFIDE GRIGIO:** sporadica presenza. intervenire a superamento soglia (5% di piante colpite) con Azadiractina, Flonicamid, Imidacloprid, Thiametoxam, Acetamiprid, Clothianidin, Pirimicarb, Spirotetramid (attivo anche per l'Afide lanigero), Sali di potassio di acidi grassi (Flipper).

**PSILLA:** in caso di elevata presenza di uova in avanzato stadio di sviluppo o alle prime nascite intervenire con Abamectina, Olio minerale estivo. In presenza di melata procedere con lavaggi impiegando elevati volumi di irrorazione.

**OLIVO fase fenologica: ALLEGAGIONE**

---

#### **DIFESA**

**OCCHIO DI PAVONE (Cicloconio):** si segnala la presenza, è possibile intervenire in previsione di piogge. I trattamenti rameici hanno efficacia anche contro la batteriosi.

**ROGNA DELL'OLIVO:** la comparsa della malattia si ha nelle varietà più sensibili in occasione di grandinate e danni da gelo. In questi casi si consiglia di intervenire.



**BOLLETTINO DI AGRICOLTURA BIOLOGICA**

---

Tutte le operazioni colturali devono volgere a mantenere un equilibrio vegeto-produttivo delle piante, al fine di aumentare le difese naturali e diminuire i potenziali attacchi delle avversità, salvaguardando l'ambiente circostante.

## **NORMATIVA**

### **FERTILIZZANTI COMMERCIALI**

Verificare che sul prodotto ci sia l'indicazione "Consentito in agricoltura biologica" o controllare la presenza delle materie prime che compongono il prodotto all'interno dell'elenco dell'allegato I del Reg. 889/2008, indicato anche sul Decreto legislativo 217/2006.

### **SEMENTI E MATERIALI DI PROPAGAZIONE**

Si ricorda che le piantine e il seme impiegato devono essere biologiche certificate. Se non si riesce a reperire sul mercato seme biologico della varietà desiderata è possibile utilizzare seme convenzionale non trattato con prodotti non consentiti in agricoltura biologica. Per la richiesta di deroga per le sementi scaricare il modulo dal sito: <http://www.scs.entecra.it/> > sementi biologiche > Stampa modulo per la richiesta di deroga (Allegato 7). La richiesta di deroga deve essere fatta almeno 30 giorni prima della semina per le sementi ed il materiale di moltiplicazione vegetativo e almeno 10 giorni prima dell'impianto per le sementi ortive. La sede dell'ENSE è in Via Ugo Bassi, 8 - 20159 MILANO - Tel. 02/69012046 - Fax 02/69012049 indirizzo e-mail Sementi Biologiche: [deroghe.bio@crea.gov.it](mailto:deroghe.bio@crea.gov.it). Le richieste di deroga dovranno, quindi, essere spedite al numero di fax o inviate via e-mail.

Certificazione sanitaria per le piante da frutto e la vite: è opportuno ricorrere a materiale certificato virus esente e cartellinato.

### **SITI SULL'AGRICOLTURA BIOLOGICA**

[www.isnp.it](http://www.isnp.it) - [www.scs.entecra.it](http://www.scs.entecra.it) - [www.sinab.it](http://www.sinab.it) - [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it) - [www.stuard.it](http://www.stuard.it) -  
[www.fiao.it](http://www.fiao.it) - [www.biogest.com](http://www.biogest.com) - [www.greenplanet.net](http://www.greenplanet.net) - [www.ifoam.org](http://www.ifoam.org) - [www.aiab.it](http://www.aiab.it)  
[www.ccpb.it](http://www.ccpb.it) - [www.bioagricert.org](http://www.bioagricert.org) - [www.organic-bio.com](http://www.organic-bio.com) - [www.suoloesalute.it](http://www.suoloesalute.it)

<b>COLTURE ERBACEE</b>
------------------------

---

**FRUMENTO TENERO e DURO** fase fenologica: **MATURAZIONE LATTEA - CEROSA**

## **DIFESA**

La difesa può considerarsi conclusa.

---

**POMODORO fase fenologica: ALLEGAGIONE 2° PALCO NEI PRIMI TRAPIANTI -  
FIORITURA 1° PALCO NEI MEDI**

---

Sono in corso i trapianti più tardivi, con una superficie trapiantata stimata al 95% di quella programmata.

**PERONOSPORA:** il rischio Peronospora è molto basso, modello epidemiologico IPI sotto soglia di attenzione, tuttavia i temporali previsti ad inizio settimana, con lieve riduzione delle temperature, consigliano un trattamento cautelativo con rame.

**BATTERIOSI:** le escursioni termiche, il forte vento e le piogge di maggio hanno determinato la comparsa delle primissime infezioni di *Pseudomonas siringae* pv. *tomato*. In previsione di piogge si consiglia di proteggere le varietà meno tolleranti con Sali di rame o *Bacillus subtilis*.

<b>COLTURE ARBOREE</b>
------------------------

## **ASPETTI AGRONOMICI**

### **Gestione del terreno per fruttiferi e Vite**

**Fertilizzanti commerciali:** verificare che sul prodotto ci sia l'indicazione "Consentito in agricoltura biologica" o controllare che le materie prime che compongono il prodotto siano all'interno dell'elenco dell'allegato I del Reg. 889/2008 ed integrazione successiva 354/2014 di modifica degli allegati I e II relativamente alle sostanze impiegabili in agricoltura biologica.

**Gestione fertilità frutteti:** gli apporti devono tener conto della fertilità del terreno e delle esigenze nutrizionali degli alberi, così pure delle tecniche colturali applicate nel frutteto. L'azoto influenza lo sviluppo vegetativo e la produzione delle piante, per cui è uno dei principali elementi da considerare: si possono analizzare le forme di azoto disponibili tramite analisi terreno, inoltre l'osservazione visiva dello stato vegeto-produttivo è un utile strumento di valutazione. Se deve essere apportato azoto vanno considerati i tempi di mineralizzazione del fertilizzante utilizzato per rendere disponibile l'elemento nel periodo di effettiva utilizzazione della pianta. Nel periodo di fine estate possono essere distribuiti concimi azotati per accumulare riserve nutritive che saranno utilizzate in fioritura e allegagione, come per esempio fertilizzanti commerciali a base di pollina, sangue, borlanda.

**Sovescio frutteti e vigneti:** si possono effettuare semine interfilari in tutti gli impianti arborei in allevamento. Negli impianti in produzione si possono fare semine sui filari se

---

vengono lavorati. Le essenze consigliate sono: orzo-veccia comune, orzo-favino, avena-veccia comune.

#### VITE fase fenologica: ALLEGAGIONE - INIZIO INGROSSAMENTO ACINI

---

##### ASPETTI AGRONOMICI

**Gestione della chioma:** in considerazione dello sviluppo vegetativo iniziare le operazioni di leggera cimatura.

##### DIFESA

**PERONOSPORA:** nei due campi spia (porzione di vigneto non trattato), che vengono monitorati costantemente, non sono comparse macchie d'olio per cui le piogge del 6-7 maggio non sono risultate infettanti, come previsto dal modello IPI.

Considerato il previsto tempo stabile con temperature in aumento si consiglia di rinnovare la copertura della vegetazione utilizzando Sali di rame.

**OIDIO:** nei due campi spia (porzione di vigneto non trattato) sono comparse nuove infezioni di Oidio causate dalle ascospore (responsabili delle infezioni primarie) rilasciate con le piogge di maggio. Considerato il previsto periodo di tempo stabile con temperature in aumento è alto il rischio di inizio della fase epidemica dell'Oidio, per cui si consiglia di rinnovare la protezione della vegetazione con Zolfo bagnabile, Bicarbonato di potassio (Amicarb 85, Karma 85), Olio essenziale di arancio dolce (Prevam-Plus), Laminarina (Vacciplant), *Ampelomyces quisqualis* (AQ 10 WG).

**FLAVESCENZA DORATA:** anche quest'anno è obbligatoria la lotta alla Flavescenza dorata. In agricoltura biologica sono obbligatori almeno due interventi con Piretrine pure (Asset, Estel, Abanto, Piretro Natura, Biopiren Plus, Agro-Pyr, Piretro verde, Flora verde, Piretro Actigreen, Several, Afitin L. Sulla base del monitoraggio del vettore *Scaphoideus titanus*, eseguito dai tecnici del Consorzio Fitosanitario, nella provincia di Parma il primo il trattamento è consigliato dal 10 al 20 giugno ed il secondo dopo 20-25 giorni.

**ACARIOSI:** presenza di sintomi sulle foglie basali, non si richiedono interventi specifici.

**BOSTRICO DELLA VITE:** provvedere alla distruzione o bruciatura delle fascine.

#### ALBICOCCO fase fenologica: INGROSSAMENTO FRUTTI

---

##### DIFESA

**BATTERIOSI:** in impianti colpiti negli anni precedenti o in varietà sensibili, effettuare l'intervento in previsione di pioggia o prolungate bagnature con Sali di rame (Poltiglia Disperss Selecta) a basse dosi, ripetendo dopo 7-10 giorni in base a previsione di abbondante precipitazioni o prolungate bagnature.

**OIDIO:** intervenire dalla fase di scamiciatura in previsione di piogge con Zolfo.

---

**FORFICULE:** monitorare presenza con trappole rifugio (cartone ondulato o segmenti di canna). In presenza di danni nell'anno precedente formare un anello di colla attorno al tronco per impedire la risalita degli insetti e danni sui frutti. Interventi per altre avversità con Spinosad sono attivi contro forficula se effettuati di notte.

**AFIDI:** in caso di presenza dell'avversità intervenire con Piretro naturale, eventualmente in miscela ad Olio minerale.

### **PESCO fase fenologica: INGROSSAMENTO FRUTTI**

---

#### **DIFESA**

**BATTERIOSI** (*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni*): le condizioni favorevoli alla batteriosi sono temperature di 14-19°C e almeno 48 ore di bagnatura. In impianti colpiti negli anni precedenti o in varietà sensibili, effettuare l'intervento in previsione di pioggia o prolungate bagnature con Sali di rame (Poltiglia Disperss Selecta) a basse dosi, ripetendo dopo 7-10 giorni in base a previsione di abbondante precipitazioni o prolungate bagnature.

**FUSICOCCO DEL PESCO:** si consiglia di asportare i rami colpiti.

**OIDIO:** sulle varietà sensibili, nelle zone ad alto rischio di collina o in pescheti con forti infezioni negli anni precedenti intervenire con Zolfo o Polisolfuro di calcio

**CIDIA MOLESTA:** da modello prosegue l'ovodeposizione ed è cominciata la nascita larvale. Indicazioni su eventuali interventi saranno forniti nei prossimi bollettini. Provvedere alla sostituzione del fondo coloso e del feromone delle trappole.

**AFIDE VERDE:** presenza di infestazioni, a superamento del 3% di getti infestati su nettarine, 10% su pesche e percoche, intervenire con prodotti a base di Sali di potassio di acidi grassi (Flipper) o Piretro naturale.

**FORFICULE:** monitorare presenza con trappole rifugio (cartone ondulato o segmenti di canna). In presenza di danni nell'anno precedente formare un anello di colla attorno al tronco per impedire la risalita degli insetti e danni sui frutti. Interventi per altre avversità con Spinosad sono attivi contro forficula se effettuati di notte.

### **CILIEGIO fase fenologica: INVAIATURA FRUTTI - RACCOLTA CV. PRECOCI**

---

#### **DIFESA**

**AFIDE NERO:** in presenza di infestazione intervenire con Piretro naturale, eventualmente in miscela ad Olio minerale. Le formiche esercitano un'azione di protezione delle colonie di afidi difendendoli da predatori e parassitoidi. Si ricorda che è buona pratica impedire la salita di formiche applicando sul perimetro del tronco un anello di colla.

---

**MOSCIERINO DEI PICCOLI FRUTTI** (*Drosophila suzukii*): rilevate ovodeposizioni in campo. Si ricorda che gli interventi effettuati da invaiatura con Spinosad per altre avversità hanno effetti anche contro questo parassita.

**MOSCA:** installare le trappole cromotropiche gialle per il monitoraggio.

#### **MELO fase fenologica: INGROSSAMENTO FRUTTI**

---

**TICCHIOLATURA:** in previsione di piogge intervenire con Sali di rame, eventualmente in miscela con Zolfo, oppure in alternativa Polisolfuro di calcio immediatamente dopo le piogge.

**OIDIO:** non si sono osservati sintomi in campo. Intervenire alla comparsa dei primi sintomi con Zolfo.

**CARPOCAPSA:** da modello completata la nascita larvale. E' possibile intervenire con Spinosad o *Bacillus thuringensis*.

**AFIDE GRIGIO:** ridotta presenza. Intervenire con infestazione in atto con Sali di potassio di acidi grassi (Flipper).

#### **PERO fase fenologica: INGROSSAMENTO FRUTTI**

---

##### **DIFESA**

**TICCHIOLATURA:** in generale gli attacchi sono molto lievi. Il potenziale di inoculo è quasi esaurito. Mantenere protetta la vegetazione, in previsione di piogge o bagnatura con Sali di rame, eventualmente in miscela con Zolfo, oppure in alternativa Polisolfuro di calcio immediatamente dopo le piogge.

**CARPOCAPSA:** da modello completata la nascita larvale. E' possibile intervenire con Spinosad o *Bacillus thuringiensis*.

**AFIDE GRIGIO:** ridotta presenza. Intervenire con infestazione in atto con Sali di potassio di acidi grassi (Flipper).

**Psilla:** in caso di presenza dell'avversità, intervenire sulle uova con Olio minerale od effettuare lavaggi sulle neanidi con prodotti a base di Sali di potassio di acidi grassi (Flipper). Valutare la presenza di antocoridi e la possibilità di effettuare lanci con *Anthocoris nemoralis*.

**TINGIDE:** si segnala la presenza degli adulti in campo. Non è consigliabile effettuare trattamenti in questo stadio. Si rimanda ai prossimi notiziari per ulteriori indicazioni.

#### **OLIVO fase fenologica: ALLEGAGIONE**

---

##### **DIFESA**

**OCCHIO DI PAVONE (Cicloconio):** si segnala la presenza, è possibile intervenire in previsione di piogge. I trattamenti rameici hanno efficacia anche contro la batteriosi.



**ROGNA DELL'OLIVO:** la comparsa della malattia si ha nelle varietà più sensibili in occasione di grandinate e danni da gelo. In questi casi si consiglia di intervenire.

## **DIVIETO SPOSTAMENTO ALVEARI**

Per contenere la diffusione del batterio *Erwinia amylovora*, responsabile del Colpo di Fuoco Batterico, è vietato introdurre alveari provenienti da zone contaminate, quali le provincie di Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Rimini, Ravenna, Modena e Reggio Emilia, all'interno di zone protette quali le provincie di Parma e Piacenza nel periodo compreso dal 20 marzo al 30 giugno. E' inoltre vietata, nello stesso periodo, la movimentazione degli alveari ubicati all'interno delle "zone di sicurezza" delle provincie di Parma e Piacenza verso territori riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (zone protette). Le zone sono individuabili al seguente link: <http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=50be1672acc94a78910459c78e9743cd>. Lo spostamento è consentito solo in caso di adozione delle norme da quarantena consultabili al seguente link: <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/avversita/avversita-per-nome/colpo-di-fuoco/normativa/2017-spostamento-alveari>

### **NOTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 08 MAGGIO 2017**



**GESTIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI CON IMBALLAGGI ED ETICHETTATURA DPD (PITTOGRAMMI NERO/ARANCIO) GIACENTI PRESSO RIVENDITORI AL DETTAGLIO E UTILIZZATORI PROFESSIONALI.**

A partire dal 1° giugno 2017, il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) entrerà in piena applicazione e, di conseguenza, tutti i prodotti fitosanitari dovranno essere imballati ed etichettati secondo i requisiti previsti dal regolamento stesso e cesserà la deroga di 2 anni che ha consentito la commercializzazione di prodotti etichettati secondo la precedente normativa, la direttiva 1999/45/CE (DPD).

Pertanto dal 1° giugno 2017:

- gli utilizzatori professionali non potranno più acquistare prodotti con etichette DPD;
- gli utilizzatori professionali potranno ancora impiegare i prodotti con etichette DPD, acquistati antecedentemente tale data e giacenti presso il loro magazzino, purché:
  - i formulati risultino prodotti prima del 31 maggio 2015 (la data è quella del lotto di produzione riportata in etichetta);

- 
- dispongano dell'etichetta e della scheda di sicurezza aggiornate secondo il sistema CLP.

In caso di controllo occorre esibire le fatture di acquisto (che dovranno essere antecedenti al 1° giugno 2017), le etichette e le relative schede di sicurezza aggiornate.

I titolari di registrazione ed i rivenditori al dettaglio dovranno adoperarsi per diffondere agli utilizzatori professionali le etichette e le schede di sicurezza aggiornate.

Informazioni e testo ministeriale disponibili sul sito del Consorzio Fitosanitario all'indirizzo: <http://www.fitosanitario.pr.it/news-novita-incontri-convegni/gestioni-prodotti-fitosanitari-etichettatura-dpd/>

**BOLLETTINO IRRIGAZIONE C.E.R.: elaborazione del 05/06/2017**

Per garantire lo sviluppo delle colture, sia seminate che trapiantate, e un'adeguata produzione dei frutteti, si consiglia l'irrigazione come descritto di seguito.

Irrigare tutte le colture in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet.

Si ricorda che i disciplinari prevedono che l'irrigazione dei vigneti sia consentita solo dalla fase fenologica di pre-chiusura grappolo e fino all'invaiaitura, quindi l'irrigazione poc'anzi consiglia deroga i disciplinari.

E' consigliato non ritardare eccessivamente l'inizio delle irrigazioni con impianti microirrigui, per evitare l'accumulo di deficit irriguo difficilmente recuperabile durante la stagione irrigua. Qualora fosse necessario, è opportuno iniziare fin d'ora a irrigare, anche con moderate quantità d'acqua, restituendo la quantità evapotraspirata.

In caso di pioggia, per determinare il periodo di sospensione dell'irrigazione, occorre dividere i mm letti con il pluviometro per il consumo giornaliero della coltura interessata. Esempio: una pioggia di 37 mm su pesco con interfilare inerbito con un consumo giornaliero nel giorno di calcolo di 3.7 mm sarà pari a 10 giorni (37/3.7).

E' opportuno verificare la quantità di acqua disponibile contenuta nel terreno, prima di effettuare l'irrigazione al fine di distribuire il corretto volume irriguo, rispondendo in modo razionale alle reali esigenze delle colture.

Indicazioni relative agli evapotraspirati specifici per ciascuna coltura ed alle necessità irrigue specifiche sono disponibili tramite il servizio Irrinet all'indirizzo [www.irriframe.it](http://www.irriframe.it)

Si ricorda che il servizio di consulenza irrigua IRRINET è gratuito.

- Pomodoro: in assenza di precipitazioni superiori a 25 mm, irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 2,5
- Patata: in assenza di precipitazioni superiori a 25 mm, irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 2,5
- Cipolla: in assenza di precipitazioni superiori a 25 mm, irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 2,5
- Aglio: in assenza di precipitazioni superiori a 25 mm, irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 2,5
- Fragola: irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 3,4
- Melone: irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 3,0
- Cocomero: Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 3,0
- Bietola da seme, in assenza di precipitazioni superiori a 25 mm, irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 3,0

Arboree - In caso di piogge inferiori a 20 mm irrigare restituendo i seguenti volumi giornalieri.

COLTURA	INTERFILARE	INERBITO	INTERFILARE LAVORATO	NOTE
POMACEE	4.2	-	-	
ALBICOCCO-SUSINO	3.5	-	2.5	
CILIEGIO	4.1	-	2.5	
PESCO	3.5	-	2.5	
VITE	-	-	-	Non irrigare
ACTINIDIA	4.4	-	3.8	

Nella vite e negli arboreti, in caso di piogge inferiori a 20 mm, limitatamente a zone collinari e ai terreni sciolti, è possibile effettuare un intervento di soccorso negli impianti giovani.

In caso di pioggia, per determinare il periodo di sospensione dell'irrigazione, occorre

---

dividere i mm letti con il pluviometro per il consumo giornaliero della coltura interessata. Esempio: una pioggia di 35 mm su susino con interfilare inerbito determinerà un periodo di sospensione dell'irrigazione pari a 10 giorni (35/3.5). Si ricorda che l'irrigazione post-trapianto è sempre consentita.

#### FALDA IPODERMICA

La falda ipodermica è lo strato di terreno saturo d'acqua che può influenzare le radici delle piante, sia direttamente che per risalita capillare. I dati sono riassunti e messi a disposizione dal CER (Consorzio del Canale Emiliano-Romagnolo; ref. R. Genovesi). La Rete è attualmente costituita da 113 stazioni di rilevamento diffuse in tutte le province della regione. Ciascuna stazione è attrezzata con batterie di piezometri, fino ad una profondità max di 300 cm, in cui viene rilevata la presenza della falda con cadenza variabile a seconda della stagione. Il dato di profondità della falda può essere utilizzato per la calibrazione del consiglio irriguo.

Per i dati puntuali consultare "mappa della falda" accessibile dalla home page del sito del CER: <http://www.consorziocer.it/>

#### APPUNTAMENTI - NOTIZIE - NOTE

- Prossimo appuntamento **venerdì 16 giugno 2017 alle ore 09:00** c/o Consorzio Fitosanitario Prov.le di Parma, in Strada dei Mercati, 17 - 43126 Parma con il seguente O.d.G.:

- Aggiornamento meteorologico
- Redazione bollettino di produzione integrata
- Redazione bollettino di produzione biologica

Redazione e diffusione a cura di Valentino Testi



in collaborazione con Cristina Piazza e Sandro Cornali



con il supporto del Servizio Fitosanitario Regionale e in collaborazione con: ARPA Emilia-Romagna Servizio IdroMeteoClima - C.E.R. - PRO.BER - Organizzazioni dei Produttori AINPO, ASIPO, COPADOR - A.N.B. - Eridania Sadam -- CAP Parma - Tecnici e rivendite prodotti per l'agricoltura.

---

Chi volesse ricevere il bollettino via email deve fare richiesta a [vtesti@regione.emilia-romagna.it](mailto:vtesti@regione.emilia-romagna.it) o a [cornali@stuard.it](mailto:cornali@stuard.it).